

بررسی مقدماتی گیاهان حوزه هروآباد (خلخال)

راله صدوqi

گروه زیست‌شناسی دانشگاه تربیت معلم

مقدمه- در این پژوهش دو نکته اساسی از لحاظ گیاه‌شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد: نخست تشخیص و شناسائی گیاهان حوزه هروآباد خلخال در محدوده‌ای به وسعت ۳۰ کیلومتر مربع که مرکز آن شهر هروآباد است و دیگر توجیه مقدماتی اختصاصات رویشی این ناحیه به تبعیت از وضع زمین‌شناسی و خالک‌شناسی^۱.

در باره‌شراحت اقلیمی این حوزه، همینقدر می‌دانیم که منطقه‌ای است سردسیر با بارندگی نسبتاً زیاد.

۱- وضع جغرافیائی منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه یعنی حوزه هروآباد خلخال در جنوب شهری آذربایجان شرقی و در فزدیکی هر زیمن شهرستان طوالش و آذربایجان قرار گرفته است. این منطقه از لحاظ رُزومر فولزی شامل دشت کوچکی است که از طرف هشتر بوسیله مخروط افکنه‌های دائمی غربی ارتفاعات طوالش و از طرف مغرب بوسیله ارتفاعات کوچک و متعدد آتش‌نشانی محدود می‌شود.

بطور کلی منطقه‌ای است سردسیر، با بارندگی نسبتاً زیاد که حداقل حرارت آن در تابستان

- ۱- به لحاظ انتظامی موقعیت مطالعاتی، در این بررسی فقط گیاهان فصل تابستان جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته است. پندریج گیاهان فصول دیگر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- ۲- لازم می‌دانم از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر صادق میهن در این بررسی و نامگذاری گیاهان سپاسگزاری نمایم.

اطراف آن در محدوده موردمطالعه تا ۳۰۰۰ متر هی رسد. محتملاً این تغییر
ترکیب سنگ و خاک این محدوده عوامل اصلی تنوع اجتماعات گیاهی آنجا شده
در برخی برجستگی‌های داخل این حوزه، اجتماعات گیاهی در هر یک صد تا دو سنت متر
دشت هر و آباد بوسیله رودخانه هر و آباد که منشاء آن در شش کیلومتری
گرفته است هشروب هی شود، معدنکه بواسطه ساختمان خاص زمین‌شناسی، چه
دائمی و هوقت بتعدد زیاد در این محدوده وجود دارد.

۲- وضع زمین‌شناسی

برای مطالعه وضع کلی زمین‌شناسی این ناحیه از نقشه‌های توپوگرافی
وعکس‌های هوائی این منطقه با مقیاس $\frac{1}{50,000}$ استفاده شده است.
از لحاظ سین زمین‌شناسی، تشکیلات این ناحیه عموماً به کرتاسه تا اتوس
قدیمترین تشکیلات آن از لایه‌های آهکی است که تشکیلات جدیدتر آتش‌شانی با
تراکیتی آندزیتی و بازالتی روی آنها را می‌پوشاند.
قسمت شمال شرقی و برجستگی آهکی هوسوم بدکوه عجم محدوده هی شود
آن ارتفاعات از نورا در بر می‌گیرد که آهکی بوده و به دوره کرتاسه تعلق دارد.
نیمه غربی این حوزه هم‌جا از آندزیت و بازالت و توف‌های آندزیتی شناخته شده
متعلق به دوره کرتاسه تا اتوسون است، فقط در قسمت‌های کم ارتفاع، تشکیلات این
آبرفتنهای جدید پوشیده هی شود و همین قسمتها بخش‌های هرزه‌وعی حوزه هر و آباد
را تشکیل هی دهد.

تشخیص حوزه‌های گیاهی

در محدوده نقشه مورد مطالعه سه حوزه متمایز تشخیص هی دهیم که بنظره
ارتفاع محل و جنس سنگ و خاک موجب تفاوت اجتماعات گیاهی گردیده است.
۱- در این منطقه تاکنون استگاه‌هواشناسی دایر نشده است.

این حوزه شامل دو بخش جستگی است که در فاصله ۵/۴ کیلومتری جنوب شهر هروآباد قرار گرفته، از تشكیلات و طبقات آهکی دوره کرتاسه تشکیل شده است.

این دو بخش جستگی بوسیله ریخ گسل شمالی - جنوبی از یکدیگر جدا میشوند و در محل همین گسل چشمde نسبتاً گرم از نو ظاهر می شود که آب آن آهک دار بوده، دشت هروآباد را مشروب می سازد. حوزه از نو باداشتن ترکیب سنگ شناسی و خالکشناسی تقریباً ثابت ازدامنه بر جستگیها تا بالاترین نقطه آن که در حدود ۴۰۰ متر اختلاف ارتفاع دارد بارخساره های گیاهی خاصی مشخص می شود که بنظر می رسد ناشی از همین اختلاف ارتفاع باشد. بطور کلی در بخش دامنه و سنگلاخی که ارتفاعی بین ۱۷۰۰ تا ۱۷۳۰ متر داراست گیاهان خانواده گل مینا (Compositae) و پنجه بارزی دیده می شود، خصوصاً اجتماع انواع *Centaurea* مانند *C. cyanus* و *C. iberica* و *C. virgata* بسیار قابل ملاحظه می باشد. همچنین گیاه *Artemisia herba-alba* (درمنه) که شاخص نقاط استپی و نیم خشک ایران است گیاه پردوام این بخش را تشکیل می دهد.

در بخش بالاتر یعنی تا حدود ارتفاع ۱۸۰۰ متر، گیاه *Acantholimon* از تیره Plumbaginaceae یا بوته های بسیار انبوه و پریش مشاهده می گردد (تصویر شماره ۱). در ارتفاع بالاتر یعنی حدود ۱۸۵۰ متر اجتماع *Verbascum persicum* مشاهده می گردد (تصویر شماره ۲). درین گیاهان ذکر شده گیاهان *Scrophulariaceae* بسیار محدودی از تیره های مختلف وجود دارند که نام آنها را بعداً ذکر خواهیم کرد.

در قسمت های مرتفع کوه، اجتماع بسیار انبوه و زیبائی از درختچه *Cotoneaster nummularifolia* (تصویر شماره ۳) از تیره Rosaceae مشاهده می گردد که تقریباً تمام سطح کوهستان را اشغال کرده است، بطوریکه در آن محل ندرتاً گیاهی از تیره های دیگر مشاهده می شود.

بطور کلی تنوع گیاهی در قسمت دامنه کوه و در محل شکستگیها بیش از ارتفاعات بالاست. گیاهانی که از این منطقه گردآوری شدند عبارتند از:

- 5 *Salvia nemorosa*
- 6 *Lactuca vinimea*
- 7 *Isatis latisiliqua*
- 8 *Rubia tinctorum*
- 9 *Siderites montana*
- 10 *Gypsophilla sp.*
- 11 *Cotoneaster nummularifolia*
- 12 *Onopordon imperialis*
- 13 *Turgenia latifolia*
- 14 *Salsola kali*
- 15 *Centaurea cyanus*
- 16 *Melilotus alba*
- 17 *Falcaria scioides*

ب - حوزه شرقی هر و آباد (گوئی) - که بین محدوده شهر و ارتفاعات آهکی قرار دارد، سنگ اصلی آن از نوع آندزیتی است که بصورت تپه های منفرد دیده می شود. خارجی این تپه ها بوسیله قشری از خاک پوشیده می شود که دامنه های آن تشكیل زمزرومی را می دهد.

این تپه ها ارتفاعات کوچکی هستند که اختلاف ارتفاعشان از دامنه تا قله بیش از نیست، بنظر میرسد که عدم تنوع اجتماعات گیاهی ناشی از همین عامل باشد.

در قسمت دامنه یعنی ارتفاعی در حدود ۱۶۵۰ متر گیاهانی از خانواده Asteraceae مشاهده می گردد. گیاه مسلط این بخش *Cirsium lappaceum* می باشد و

- 1 Thymus off. kochyi
- 2 Verbascum persicum
- 3 Euphorbia esula
- 4 Marrubium vulgare
- 5 Daphne angustifolia
- 6 Teucrium sp.
- 7 Rumex hastata
- 8 eliotropium
- 9 Dianthus sp.
- 10 Scrophularia canina
- 11 Sedum annuum
- 12 Silene conica
- 13 Reseda lutea
- 14 Polygonum convolvulus
- 15 Siderites montana
- 16 Anagallis arvensis
- 17 Chenopodium botrys
- 18 Centaurea iberica
- 19 Vaccaria pyramidata
- 20 Lamium amplexicaule
- 21 Dipsacus silvestris
- 22 Centaurea virgata
- 23 Rumex crispa
- 24 Avena sativa
- 25 Dactylis glomerata

خاکهای حاصل از تجزیه مواد آتش فشانی بیز از ارتفاعات بالاتر باین منطقه سر از بر ترکیب مخلوطی ایجاد کرده است.

با وجود اختلاف ارتفاعی که از دامنه تا اس این رشته ها مشاهده می شود اجتماع در این حوزه محدود بوده و بیش از پانز نوع گیاه حسط دیده نمی شود. قسمت اساسی این پوشیده از گیاه آکانتولیمون می باشد و بطور کلی گیاهانی که از این بخش جمع آوری شده اند عبارت

Verbascum persicum

Glycrrhiza glabra, var. *glandulosa*

Xeranthemum annuum

Inula odora

Tamarix gallica

Chenopodium botrys

Achillea millefolium

Teucrium

Malva silvestris


Cephaelis syriaca


Ononis

12 *Erodium moschatum*


مقایسه جنس خاک در قسمت شرقی و غربی هر دو آباد و همچنین وضع تابش نور و دوام برف و رطوبت در این دو بخش نشان میدهد که قسمت شرقی منطقه دارای خاک سنگهای آتشفشاری بوده و ضمناً دوام نور خورشید در روز در آنجا بیشتر است، در این بخش غربی، خاک دارای تنوع بیشتری است و ضمناً ساعت تابش نور در روز کمتر می باشد. انسواع گیاهان در این دو بخش معمولاً ناشی از این دو عامل است. با مقایسه لیست جمع آوری شده از این دو بخش می توان پی برد که فقط ۳۳ گیاه زیر در رویشهای تابستانی

- 1- *Verbascum persicum*
- 2- *Teucrium sp.*
- 3- *Chenopodium botrys*





تصویر شماره ۱- اجتماع *Acantholimon* دامنه ارتفاعات آهکی از نو
(در ارتفاع ۱۷۰۰ متر) منشکل از واریزه آهکی و خاک که در آن اجتماع
آکانثولیمون همر اه با گیاهان دیگری مانند *Astragalus*، *Verbascum* دیده میشود.



تصویر شماره ۲ - اجتماع *Verbascum* در ارتفاع ۱۸۵۰ متری کوه
از نو-جنی خاک؛ مواد تخریبی آهکی و خاک حاصل از آن.



نمونه از گیاه *Verbascum* از محل می بوط به تحقیق شماره ۲



تصویر شماره ۳ - دامنه شمالی کوه ازنو منشکل از خاک و وارینه آهکی
ودشت و باغات شمالی تر آن که از جنس خاکهای مخلوط
آهکی و آتشخواری است .

منابع

- 1- Bonnier, G. - Flore complète illustrée de France, Suisse et Belgique. 12 vol. Paris
- 2- Parsa, A. - Flore de l' Iran. 5 vol. et supplément. Danesh édit. Tehéran. 1951
- 3- Lawrence, G. H. M. - Taxonomy of vascular plants. Mc Millan ey; New York 1951
- 4- آهرانی، خسرو - خلاصه‌ای از اطلاعات چینه‌شناسی منطقه هروآباد (خلخال) - پلی کپی
- 5- رضوی، محمد حسین - منگ شناسی تاحیه هروآباد خالخال - گزارش چاپ نشده
- 6- زرگری، علی - روش‌شناسی گیان - جلد اول و دوم و سوم - ۱۳۴۱
- 7- مبین، صادق - رستنی‌های ایران - جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴