

است که در آن $\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}$ است. این مدل را مدل مارکف می‌نامند. این مدل مارکف را می‌توان با مدل مارکف معمولی مقایسه کرد. مدل مارکف معمولی دارای معادله زیر است:

$$(X_t)_{t=1}^n \sim M(1, \phi^2) \quad (1)$$

یادداشتی بر برآوردهای درستنمایی بیشینه تقریبی پارامتریک فرایند AR(1) مبتنی بر یک سری دوتایی و مقایسه آن با برآوردهای درستنمایی بیشینه داده‌های اولیه

حسینعلی نیرومند

گروه آمار - دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی (مشهد)

$$Z_1 = \phi Z_{1,1} + u_1, \quad t = \dots, -2, -1, 0, +1, +2, \dots$$

که $| \phi | < 1$ ، مدل مارکفی تصادفی $N(0, \sigma^2)$ مستقل اند و در اینصورت (Z_t) یک فرآیند گوسی مانای با میانگین صفر است را در نظر می‌گیریم. حال سری (X_t) را به صورت

$$X_t = \begin{cases} 1 & Z_t \geq 0 \\ 0 & Z_t < 0 \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots, n$$

تعریف می‌کنیم و سری حاصل که دنباله‌ای از صفر و یکهاست را یک سری دوتایی می‌نامیم که از لحاظ مقدار و پارامتر

گسته است و تحلیل بر مبنای آن آسان و سریع خواهد بود. با

دادن سری گسته (X_t) می‌توانیم تعداد گشتهای ۱ را مشاهده کنیم و در نتیجه اطلاعات در سری به شکل‌گیری انواع مختلف گشتها بستگی دارد. در اینجا فرض بر این است که سری (X_t) یک زنجیر مارکف تنشیل می‌دهد زیرا با توجه به این فرض توزیع توان سری همواره امکان‌پذیر است. در این مقاله در صورت معلوم بودن سری دوتایی $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n$ از گشتهای

$$R = \sum_{t=2}^n X_t X_{t-1} \quad S = \sum_{t=1}^n X_t$$

استفاده می‌کنیم و می‌توان دید که

این مدل را مارکف مارکی می‌نامیم. این مدل مارکف مارکی دارای معادله زیر است:

$$\hat{\phi} = \frac{(S - R)}{(n - 1)} \quad (2)$$

این معادله مارکف مارکی می‌باشد. مدل مارکف مارکی دارای معادله زیر است:

$$\hat{\phi} = \frac{(S - R)}{(n - 1)} \quad (3)$$

چکیده: در این مقاله یک فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول $Z_t = \phi Z_{t-1} + u_t$ که u_t مدل مارکف مارکی می‌باشد را در نظر می‌گیریم. این فرآیند را دوتایی کرده و آنرا (X_t) می‌نامیم و با توجه به این فرض که (X_t) یک زنجیر مارکف می‌سازد. برآورد درستنمایی بیشینه تقریب پارامتر ϕ مبتنی بر سری دوتایی را بدست آورده و آن را با برآوردهای درستنمایی بیشینه متقابل مبتنی بر داده‌های اولیه مقایسه می‌کنیم.

واژه‌های کلیدی:

فرآیند اتورگرسیو، فرآیند دوتایی، زنجیر مارکف، برآوردهای درستنمایی بیشینه

مقدمه:

هدف این مقاله ارائه کار جدیدی در تحلیل سریهای زمانی است. تحلیلی که خواهیم دید مبتنی بر روش‌های شمارش است که منجر به محاسبه سریع برآورد پارامتر یک فرآیند اتورگرسیو مرتبه اول می‌شود و زمان محاسبه آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. فرآیند اتورگرسیو مارکی مربوط

$$P(X_{n-1}^{(M)}, X_n^{(M)}) = \frac{1}{2} \prod_{i=1}^{n-1} P(X_2 | X_1) P(X_3 | X_2) \dots$$

$$P(X_n | X_{n-1}) = \frac{1}{2} \lambda_1^{2s-2r-x-x} \lambda_1^{(n-1)-(2s-2r-x-x)}$$

S-R در حقیقت تعداد گشتها ۱ است.

توزیع توان سری زمانی دوتایی $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ از زنجیر مارکف عبارت است از

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \frac{1}{2} \prod_{i=2}^n \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{y_i} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{1-y_i}$$

به طوری که حاصل ضرب دوم روی ۲ و اتسابی

$$\lambda_i = \begin{cases} x_i & y_i = 1 \\ 1-x_i & y_i = 0 \end{cases}$$

که در صورتیکه $\lambda_1 = 1/2$ ، این توزیع توزیع هر سری زمانی دوتایی X_1, X_2, \dots, X_n است.

لم ۲ (Cramer, H. (1946))

فرض کنید (X, Y) دارای یک توزیع نرمال دو متغیری با پارامترهای $EX = EY = 0$ و $VarX = VarY = \sigma^2$ و همبستگی ρ باشد آنگاه

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \sin^{-1}(\rho)$$

بازجه به این لم و بازجه به این که در فرایند اتوگرسیو مرتبه اول، $Z_t = \phi Z_{t-1} + u_t$ تابع خود همبستگی به صورت

$$\rho_k = \begin{cases} 1 & K=0 \\ \phi^k & K \neq 0 \end{cases}$$

$$\phi = \sin \pi (\lambda_1 - \frac{1}{2})$$

است می توان دید که

و بالاخره برآورد درستنمایی بیشینه تقریبی ϕ مبتنی بر فرایند

$\hat{\phi} = \cos \frac{2\pi \text{ عدد گشتها}}{n-1}$ عبارت است از $\{X_t, t = 1, 2, \dots, n\}$

قضیه (Yilvisaker, N.D(1965))

اگر $\{X_t, t = 1, 2, \dots, n\}$ سری دوتایی حاصل از $\{Z_t, t = 1, 2, \dots, n\}$ یک زنجیر مارکف تشکیل دهد در آنصورت توزیع تعداد دفعات تغییر از ۰ به ۱ و بالعکس دو جمله‌ای با پارامترهای $1-\lambda_1$ و λ_1 است که $\Pr(Z_t \geq 0) = 1/2$.

تعريف (Malevich, T. L. (1969))

سری $X_t^{(M)}$ را یک سری M-dependent گوییم هرگاه درستنمایی $(X_{k+r}^{(M)}, \dots, X_m^{(M)})$ و وقتی $M > r$ مستقل باشند.

لم ۱

اگر $O \rightarrow M \rightarrow \dots \rightarrow M$ آنگاه $X_t^{(M)}$ به طور یکنواخت در ادر میانگین توانهای دوم به $X_t^{(M)}$ همگرا است Malevich ثابت می کند که درستنمایی مبتنی بر $X_t^{(M)}$ درستنمایی بر پایه X_t را تقریب می کند، بویژه برای M بزرگ و بازجه به مانایی توزیع توان $X_1^{(M)}, X_2^{(M)}, \dots, X_{2+M}^{(M)}, X_{3+M}^{(M)}, \dots, X_{(n-1)+rM}^{(M)}, X_{n+rM}^{(M)}$

که r عدد صحیح و مثبت است عبارت است از:

$$P(X_1^{(M)}, X_2^{(M)}, X_{2+M}^{(M)}, X_{3+M}^{(M)}, \dots, X_{(n-1)+rM}^{(M)}, X_{n+rM}^{(M)}) = P(X_1^{(M)}, X_2^{(M)}) P(X_2^{(M)}, X_3^{(M)}) \dots$$

یک مطالعه شبیه‌سازی
می دانیم که برآوردگر بیشینه متداول $\hat{\phi}$ در فرایند اتوگرسیو مرتبه اول، $Z_t = \phi Z_{t-1} + u_t$ که از داده‌های اولیه بدست می آید با تغییراتی عبارت است از

(Box & Jenkins(1976))

$$\hat{\phi} = \frac{(\sum_{t=2}^n Z_t Z_{t-1}) / (\sum_{t=2}^n Z_t^2)}{n-1}$$

چون می‌دانیم $\hat{\phi}$ برآوردهای درستنمایی بیشینه‌ای نیست که از $\hat{\phi}$ و $\hat{\phi}$ حاصل از سری $\{Z_t, t=1, \dots, n\}$ بدست می‌آید لذا می‌خواهیم بدانیم $\hat{\phi}$ در مقایسه با برآوردهای درستنمایی بیشینه $\hat{\phi}$ چقدر خوب است؟ برای انجام این امر با استفاده از شبیه‌سازی $\hat{\phi}$ را با $\hat{\phi}$ مقایسه می‌کنیم. ملاحظه می‌کنیم که متوسط $\hat{\phi}$ برآوردهای نقطه‌ای را می‌دهد که به خوبی متوسط $\hat{\phi}$ است ولی میانگین توان دوم خطای $\hat{\phi}$ یا مساوی با میانگین توان دوم $\hat{\phi}$ است یا قدری از آن کمتر می‌باشد. معهدها برای داده‌های زیاد تفاوت بین دو برآورد بدست می‌آوریم. نتایج این شبیه‌سازی در جدول (۱) معکسر قابل اعماض است.

جدول (۱): مقایسه میانگین برآوردهای $\hat{\phi}$ و $\hat{\phi}$ متناسب با حجم n از ترآیند انورگرسیو مرتبه اول

σ^2	ϕ	n	$\hat{\phi}$	$\hat{\phi}$	$MSE\hat{\phi}$	$MSE\hat{\phi}$
500.0	0.8	400	0.771	0.777	0.003	0.004
		600	0.780	0.789	0.001	0.002
		800	0.779	0.788	0.001	0.002
	0.5	400	0.466	0.474	0.004	0.008
		600	0.472	0.479	0.003	0.004
		800	0.471	0.480	0.002	0.004
25	0	400	-0.016	-0.016	0.004	0.004
		600	-0.019	-0.037	0.002	0.004
		800	-0.018	-0.029	0.003	0.004
	-0.4	400	-0.392	-0.371	0.004	0.007
		600	-0.405	-0.382	0.002	0.005
		800	-0.404	-0.391	0.002	0.006
0.001	0.8	400	0.806	0.799	0.001	0.002
		600	0.801	0.801	0.000	0.002
		800	0.803	0.801	0.001	0.001
	0.5	400	0.505	0.509	0.002	0.006
		600	0.497	0.494	0.001	0.003
		800	0.500	0.490	0.001	0.002
0.0001	0	400	0.004	-0.013	0.003	0.007

		600	-0.006	-0.008	0.001	0.003
		800	-0.002	0.006	0.001	0.004
	0.4	400	-0.387	-0.391	0.003	0.007
		600	-0.402	-0.401	0.001	0.003
		800	-0.400	-0.397	0.001	0.003
		0.8	400	0.807	0.819	0.001
		600	0.800	0.809	0.001	0.001
		800	0.796	0.804	0.000	0.001
	0.5	400	0.512	0.525	0.002	0.007
		600	0.486	0.489	0.001	0.002
		800	0.497	0.508	0.001	0.002
	0	400	0.020	0.016	0.004	0.010
		600	0.006	0.007	0.002	0.009
		800	0.001	0.004	0.001	0.006
	0.4	400	-0.412	-0.407	0.001	0.002
		600	-0.408	-0.403	0.001	0.003
		800	-0.405	-0.396	0.001	0.002

REFERENCES

- 1- Box, G. E. P and Jenkins, G. M. (1976). TIME SEPIES Analysis forecasting and control, Holden Day.
- 2- Cramer, H. (1946), mathematical methods of statistics, princeton university press.
- 3- Malevich, T. L. (1969). Asymptotic normality of the number of crossings of level zero by a Gaussian process. Theor. Prob. Applic. 14:287-295
- 4- Yilvisaker, N. D. (1965). The expected number of zeros of a stationary gaussian process, Annals Math Statist, 36:1043-1046.

نتیجه گیری:

ضمن این که داده‌ها را می‌توان تنها در یک آماره $S-R$ منظور کرد که محاسبه آن بینهایت آسان و سریع است، از شبیه‌سازی به عمل آمده چنین بر می‌آید که ϕ در مقایسه با $\bar{\phi}$ برآوردگر نقطه‌ای بسیار خوبی برای ϕ است. این برآوردگر ضمن این که زمان محاسبات را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و خیلی سریع است بسیار اقتصادی‌تر از برآوردگر مستداول ϕ است و تفاوت در دقت این دو برآوردگر قابل صرف نظر کردن است.