تاریخ چاپ زمستان ۱۳۹۱

اثرات نسبت‌های یونی مایع اسپرمی بر پارامترهای اسپرم‌شناختی در ماهی کپور معمولی

*تقی سیفی، محمدرضا ایمان‌پور: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، گروه شیلات
چنگیز مخدومی: مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم‌آبی و خاویاری شهید رجایی ساری

چکیده

در این پژوهش اثرات نسبت‌های یونی در مایع اسپرمی ماهی‌کپور معمولی روی خصوصیات اسپرم‌شناختی سمن ماهی‌کپور بررسی شد. پارامترهای اسپرم‌شناختی (مدت زمان حرکت اسپرم، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، درصد و طول دورهٔ حرکت اسپرم)، بیوشیمیایی (میزان کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و میزان pH مورد نظر از ۱۴ ماهی نرکپور معمولی در آزمایشگاه با کمك دستگاه‌های میکروسانتریفوژ، استریومیکروسکوپ، فلیم فتومتر، اسپکتروفتومتر و پی-اچ متر اندازه‌گیری شدند. نسبت‌های یونی سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، سدیم به منیزیم، پتاسیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و کلسیم به منیزیم هر یك به ۳ تیمار تقسیم شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش نسبت سدیم به پتاسیم کیفیت اسپرم افزایش پیدا کرد ولی با افزایش نسبت سدیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و پتاسیم به کلسیم کیفیت اسپرم کاهش پیدا کرد. همچنین تغییرات نسبت‌های یونی کلسیم به منیزیم و سدیم به منیزیم تأثیر زیادی روی کیفیت اسپرم ندارند. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان این‌گونه بیان کرد که، نسبت‌های یونی روی افزایش یا کاهش کیفیت اسپرم مؤثرند.

مقدمه

ماهی‌کپور معمولی[۱] ۱۷۵۸در دریای خزر، رودخانهٔ تجن و تمام حوزه‌های آبریز ایران پراکنش دارد [۲]. سن این گونه‌ها به‌ندرت از ۲۰ سال تجاوز می‌کند و از نظر غذایی جزء ماهیان همه‌چیزخوار محسوب می‌شوند که از تنوع غذایی نسبتاً وسیعی (موجودات ریز بسترآب، کرم‌ها، سخت‌پوستان، نوزاد حشرات و حتی فضولات حیوانی و گیاهی، لاشهٔ حیوانات، تخم ماهیان و نوزادان خود) برخوردار هستند [۲۰]. ماهی‌کپور از مهم‌ترین ماهیان پرورشی به‌شمار می‌رود و پرورش آن به‌علت صرفهٔ اقتصادی و گوشت خوشمزه در اغلب کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است [۳].

واژه‌های کلیدی: ماهی‌کپور، نسبت‌های یونی، پارامترهای اسپرم‌شناختی، سمن
دریافت ۸۹/۷/۱۰ پذیرش۹۰/۷/۱۷

*نویسنده مسئول mtseifi@gmail.com

۱. *Cyprinus carpio* L.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

برای استفادهٔ کارآمد از روش‌های متنوع تولیدمثلی در آبزی‌پروری، تکثیر القایی، لقاح مصنوعی، تفریخ موفق و انجماد اسپرم نیاز به سمن با کیفیت خوب است [۴]. سمن (میلت) عبارت است از اسپرم به‌همراه پلاسمای سمینال که خود پلاسمای سمینال ترکیب منحصر به فردی دارد. برخی ترکیبات آن از اسپرم حفاظت می‌کند، در حالی‌که دیگر ترکیبات در تکثیر اسپرم نقش دارند [۱۲]. مایع سمینال از نظر یون‌ها و مواد غذایی بسیارغنی است که برخی از آن‌ها از نظر ابقا و حفظ کیفیت اسپرم هنگام ذخیره شدن در شرایط غیرحرکتی در دستگاه تناسلی اهمیت دارند. عوامل محیطی خارجی می‌توانند روی کیفیت و حرکت طی پروسه‌های فعالیت اثر بگذارند. عواملی نظیر pH یا یون‌های موجود می‌توانند باعث پلاریزاسیون غشاء سلولی و تحریك اسپرم ماهیان شوند [۱۶].

علوی و کوسون [۷] ترکیبات یونی سمن کپورماهیان، آزادماهیان، ماهیان‌خاویاری و ماهیان‌دریایی را بررسی و گزارش کردند که یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در پلاسمای سمینال غالب هستند. همچنین مقادیر یونی کلر، سدیم و پتاسیم در ماهیان‌خاویاری از کپورماهیان و آزادماهیان پایین‌تر است و ترکیبات یونی ممکن است در طی فصل تکثیر تغییر کنند. آن‌ها همچنین گزارش کردند که نسبت سدیم به پتاسیم در کپورماهیان از ماهیان‌خاویاری و آزادماهیان پایین‌تر است [۷]. تکه و همکاران [۱] نیز طی مطالعه‌ای که روی ماهی سفید انجام دادند گزارش کردند که نسبت‌های یونی بر کیفیت اسپرم در ماهی سفید اثرگذار است.

از آن‌جا که پژوهش‌های زیادی روی نسبت‌های یونی پلاسمای سمن و تأثیر آن بر خصوصیات حرکتی اسپرماتوزوآ در ماهیان انجام نشده است، خصوصاً در مورد کپور معمولی که از ارزشمندترین ماهیان ایران و دنیا است، لزوم انجام این تحقیق برای دست‌یابی به نسبت‌های مناسب یونی که بر کیفیت اسپرم اثر مثبت داشته باشند بیش‌تر احساس می‌شود. از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان برای ساختن محلول با نسبت‌های یونی مناسب ماهی‌کپور در زمینهٔ نگه‌داری کوتاه و بلند مدت اسپرم با مواد نگه‌دارنده، استفاده کرد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در فروردین سال ۱۳۸۸ در مرکز تکثیر و پرورش‌ماهی شهید رجایی ساری انجام شد. بدین‌منظور از ۱۴ ماهی نر کپور سه ساله (با میانگین طولی ۱/۴۹ ± ۵۱/۶۵ سانتی‌متر و میانگین وزنی ۱۶۹/۶۸ ±۲۶۹۱/۵۰ گرم) بدون تزریق هورمون اسپرم گرفته شد (میانگین دمای هوا ۲۰ درجهٔ سانتی‌گراد). برای جمع‌آوری اسپرم از هر ماهی نر ابتدا ناحیهٔ سوراخ تناسلی با حولهٔ نرم و تمیز خشك گردید و سپس با یك فشار آرام به ناحیهٔ شکمی (بیضه‌ها و مجرای اسپرمی) میلت بدون مخلوط شدن با ادرار و فضولات با سرنگ‌های ۵ میلی‌لیتری جمع‌آوری، در یخ نگه‌داری و برای اندازه‌گیری پارامترهای اسپرم‌شناختی و بیوشیمیایی سمن در زمان کم‌تر از ۶ ساعت به آزمایشگاه

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

مرکزی دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان منتقل گردید. ماهیان بر حسب هر یك از نسبت‌های یونی: نسبت‌های یونی سدیم به پتاسیم به ۳ تیمار (تیمار۱: ۱-۰ میلی‌مول، تیمار۲: ۲-۱ میلی‌مول و تیمار۳: ۳-۲ میلی‌مول)، سدیم به کلسیم (تیمار۱: ۶۵- ۵۳ میلی‌مول، تیمار۲: ۷۷-۶۵ میلی‌مول و تیمار۳: ۸۹- ۷۷ میلی‌مول)، سدیم به منیزیم (تیمار۱: ۲۰۰- ۱۵۰ میلی‌مول، تیمار۲: ۲۵۰-۲۰۰ میلی‌مول و تیمار۳: ۳۰۰-۲۵۰ میلی‌مول)، پتاسیم به کلسیم (تیمار۱: ۳۸-۱۹ میلی‌مول، تیمار۲: ۵۶-۳۸ میلی‌مول و تیمار۳: ۷۴-۵۶ میلی‌مول)، پتاسیم به منیزیم (تیمار۱: ۹۳-۵۱ میلی‌مول، تیمار۲: ۱۳۵-۹۳ میلی‌مول و تیمار۳: ۱۷۷-۱۳۵ میلی‌مول) و کلسیم به منیزیم (تیمار۱: ۲/۲۵-۱/۷ میلی‌مول، تیمار۲: ۲/۸-۲/۲۵ میلی‌مول و تیمار۳: ۳/۳۵-۲/۸ میلی‌مول) تقسیم شدند.

برای اندازه‌گیری درصد و طول دورهٔ حرکت اسپرم از میکروسکوپ متصل به دوربین (فازکنتراست) استفاده شد [۱۳]. برای این کار سمن ماهی‌کپور با نسبت سمن به رقیق‌کننده ۱:۲۰۰۰ رقیق شد و پارامترهای حرکتی اسپرم بلافاصله (با تأخیر زمانی کم‌تر از۷ ثانیه) بعد از شروع فعالیت اسپرم تا زمانی‌که ۱۰۰ درصد اسپرم‌ها غیرمتحرك شدند با میکروسکوپ فازکنتراست ثبت و روی صفحهٔ مانیتور نشان داده شد. مدت زمان حرکت اسپرم، از لحظهٔ فعال شدن تا زمانی‌که همهٔ اسپرم‌ها از حرکت باز می‌ایستادند اندازه‌گیری شدند [۱۹]. همهٔ آزمایش‌ها در سه تکرار و در درجهٔ حرارت اتاق (۲۲-۲۰ درجهٔ سانتی‌گراد) با میکروسکوپ فازکنتراست با درشت‌نمایی ۱۰ و مشاهدهٔ نمونه روی لام صورت پذیرفت [۱۳]. برای اندازه‌گیری اسپرماتوکریت، پس از سانتریفوژ کردن لوله‌های میکرو محتوی سمن در دستگاه سانتریفوژ با ۳۰۰۰ دور در ۸ دقیقه با استفاده از هماتوکریت خوان درصد اسپرم به پلاسمای سمن اندازه‌گیری شد [۱۴]. تراکم اسپرم با روش استاندارد هماسیتومتری با رقیق کردن اسپرم به نسبت ۱:۲۰۰۰ و با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست زمینهٔ سیاه با درشت‌نمایی ۱۰ اندازه‌گیری شد و با واحد $\times ۱۰^{۹}$ در هر میلی‌لیتر سمن نوشته شد. میزان pH توسط پی- اچ متر اندازه‌گیری شد [۱۸]. میزان کلسیم و منیزیم با کمك کیت‌های شرکت پارس آزمون و با دستگاه اسپکتروفتومتر[۱] و مقدار یون‌های سدیم و پتاسیم با فلیم‌فتومتر[۲] اندازه‌گیری شدند. میانگین پارامترهای بیوشیمیایی در ماهی‌های کپور در جدول ۱ نشان داده شده است.

جدول۱. میانگین مقادیر (میانگین± انحراف معیار) پارامترهای بیوشیمیایی در ماهی‌کپور

شاخص	میزان پارامتر
سدیم (میلی‌مول در لیتر)	۳۷۵/۷۸±۷۵/۲۴
پتاسیم (میلی‌مول در لیتر)	۲۲۷/۰۷±۶۴/۳۵
کلسیم (میلی‌مول در لیتر)	۴/۷۸±۰/۸۵
منیزیم (میلی‌مول در لیتر)	۱/۹۰±۰/۳۶

۱. S2000-UV/IS England ۲. Jenway pfp 7 England

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

شیوهٔ نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی و در قالب طرح کاملاً تصادفی بود. داده‌های به‌دست‌آمده (طول دورهٔ تحرك اسپرم، درصد اسپرم‌های متحرك، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، pH و حجم اسپرم‌دهی) در هر تیمار (نسبت‌های یونی سدیم به پتاسیم، سدیم به کلسیم، پتاسیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و کلسیم به منیزیم) به‌کمك آزمون چنددامنه دانکن در سطح ۹۵ درصد ($\alpha=$ ۰/۰۵) توسط آنالیز واریانس یك طرفه (One-Way ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS16 با یکدیگر مقایسه شدند.

نتایج

مقایسهٔ مقادیر نسبت سدیم به پتاسیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور معمولی در جدول ۲ نشان داده شده است. چنان‌که در جدول دیده می‌شود، میزان pH، حجم اسپرم‌دهی، طول دورهٔ تحرك اسپرم، درصد اسپرم‌متحرك در بین سه تیمار دارای اختلاف معنی‌داری بود ($P<$۰/۰۵). هم‌چنین میزان اسپرماتوکریت و تراکم اسپرم دارای اختلاف معنی‌دار بود ($P<$۰/۰۵)، به‌طوری‌که بیش‌ترین میزان اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم اسپرم‌دهی، طول دورهٔ تحرك اسپرم، درصد اسپرم‌متحرك و کم‌ترین میزان pH در تیمار سوم مشاهده شدند.

جدول۲. مقایسهٔ مقادیر (میانگین± انحراف معیار) نسبت سدیم به پتاسیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۱-۰ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۲-۱ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۳-۲ میلی‌مول)
pH	۸/۶۶±۰/۱۱^{a}	۸/۵۰±۰/۱۵^{a}	۸/۰۴±۰/۱۱^{b}
اسپرماتوکریت (%)	۵۷/۷۰±۴/۷۸^{ab}	۴۷/۶۰±۵/۸۲^{b}	۶۴/۶۴±۱۳/۷۲^{a}
تراکم اسپرم ($\times۱۰^{۹}$)	۱/۷۰±۰/۱۱^{ab}	۱/۳۷±۰/۱۵^{b}	۱/۸۷±۰/۳۹^{a}
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۳۷±۰/۰۸^{b}	۰/۴۵±۰/۰۹^{b}	۰/۸۴±۰/۲۷^{a}
طول دورهٔ تحرك اسپرم(ثانیه)	۳۸/۱۲±۱/۴۹^{c}	۴۲/۸۰±۲/۵۸^{b}	۵۷/۰۰±۲/۳۴^{a}
درصد اسپرم‌متحرك(%)	۴۴/۹۳±۱/۰۵^{c}	۴۹/۹۱±۳/۰۸^{b}	۶۰/۳۷±۱/۵۱^{a}

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

در جدول ۳ مقایسهٔ مقادیر نسبت سدیم به کلسیم را روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور معمولی نشان می‌دهد. مطابق جدول ۳ میزان اسپرماتوکریت ($P<$۰/۰۱)، تراکم اسپرم ($P<$۰/۰۱)، حجم اسپرم‌دهی ($P<$۰/۰۵)، طول دورهٔ تحرك اسپرم ($P<$۰/۰۵) و درصد اسپرم‌های‌متحرك ($P<$۰/۰۵) در بین سه تیمار دارای تفاوت معنی‌داری بود ولی میزان pH در بین تیمارها دارای اختلاف نبود ($P>$۰/۰۵).

جدول۳. مقایسهٔ مقادیر (میانگین± انحراف معیار) نسبت سدیم به کلسیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۶۵-۵۳ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۷۷-۶۵ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۸۹-۷۷ میلی‌مول)
pH	۸/۱۰±۰/۱۰^{a}	۸/۲۰±۰/۳۳^{a}	۸/۴۱±۰/۲۶^{a}
اسپرماتوکریت (%)	۷۲/۳۵±۳/۲۸^{a}	۶۴/۳۳±۱۰/۰۳^{a}	۵۲/۸۳±۶/۹۹^{b}
تراکم اسپرم ($\times۱۰^{۹}$)	۲/۲۰±۰/۱۱^{a}	۱/۹۱±۰/۲۸^{a}	۱/۵۲±۰/۱۷^{b}
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۷۶±۰/۳۲^{ab}	۰/۹۳±۰/۳۰^{a}	۰/۵۱±۰/۱۵^{b}
طول دورهٔ تحرك اسپرم(ثانیه)	۵۷/۳۳±۲/۰۸^{a}	۵۳/۷۵±۸/۲۶^{a}	۴۴/۰۰±۵/۰۰^{b}
درصد اسپرم‌متحرك(%)	۶۰/۳۵±۱/۹۴^{a}	۵۸/۶۳±۶/۱۵^{ab}	۵۰/۶۵±۵/۸۱^{b}

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

جدول۴ مقایسهٔ مقادیر نسبت کلسیم به منیزیم و جدول۵ مقایسهٔ مقادیر نسبت سدیم به منیزیم را روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی کپور معمولی نشان می‌دهند. مطابق جدول ۴ و جدول ۵ بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P>0/05$).

جدول۴. مقایسهٔ مقادیر (میانگین± انحراف معیار) نسبت کلسیم به منیزیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۲/۲۵-۱/۷ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۲/۸-۲/۲۵ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۳/۳۵-۲/۸ میلی‌مول)
pH	۸/۴۰±۰/۳۶^a	۸/۱۶±۰/۲۹^a	۸/۳۶±۰/۲۰^a
اسپرماتوکریت (%)	۵۵/۷۳±۱۱/۲۳^a	۶۳/۳۱±۱۰/۷۰^a	۴۹/۴۳±۱۱/۸۵^a
تراکم اسپرم ($\times 10^9$)	۱/۶۴±۰/۳۹^a	۱/۸۷±۰/۳۳^a	۱/۷۶±۰/۳۵^a
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۶۷±۰/۴۵^a	۰/۶۶±۰/۳۵^a	۰/۵۴±۰/۲۱^a
طول دورهٔ تحرک اسپرم(ثانیه)	۴۷/۶۶±۱۰/۶۹^a	۵۳/۰۰±۷/۳۲^a	۴۶/۸۰±۷/۳۲^a
درصد اسپرم‌متحرک(%)	۵۴/۱۰±۹/۹۳^a	۵۷/۲۲±۵/۲۵^a	۵۲/۸۹±۷/۱۵^a

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

جدول۵. مقایسهٔ مقادیر (میانگین ± انحراف معیار) نسبت سدیم به منیزیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۲۰۰-۱۵۰ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۲۵۰-۲۰۰ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۳۰۰-۲۵۰ میلی‌مول)
pH	۸/۲۸±۰/۲۹^a	۸/۲۶±۰/۳۵^a	۸/۳۰±۰/۲۶^a
اسپرماتوکریت (%)	۶۲/۴۷±۱۱/۱۳^a	۵۶/۰۰±۱۰/۸۲^a	۵۸/۸۱±۱۲/۳۷^a
تراکم اسپرم ($\times 10^9$)	۱/۸۴±۰/۳۴^a	۱/۶۱±۰/۲۵^a	۱/۷۸±۰/۴۶^a
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۷۴±۰/۳۴^a	۰/۵۶±۰/۲۲^a	۰/۶۶±۰/۲۱^a
طول دوره تحرک اسپرم(ثانیه)	۵۱/۵۰±۸/۴۰^a	۴۶/۶۶±۷/۰۲^a	۴۷/۶۶±۹/۲۹^a
درصد اسپرم متحرک(%)	۵۶/۷۹±۶/۸۰^a	۵۳/۶۸±۶/۷۳^a	۵۱/۵۶±۷/۵۲^a

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

جدول۶ مقایسهٔ مقادیر نسبت پتاسیم به کلسیم را روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور معمولی نشان می‌دهد. مطابق جدول ۶ بین میزان حجم اسپرم‌دهی ($P<0/05$)، pH، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، طول دورهٔ تحرک اسپرم و درصد اسپرم‌متحرک ($P<0/01$) در بین سه تیمار اختلاف معنی‌دار وجود داشت. به‌نحوی که بیش‌ترین میزان اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم اسپرم‌دهی، طول دورهٔ تحرک اسپرم، درصد اسپرم‌متحرک و کم‌ترین میزان pH در تیمار اول مشاهده شدند.

جدول۶. مقایسهٔ مقادیر (میانگین ± انحراف معیار) نسبت پتاسیم به کلسیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۳۸-۱۹ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۵۶-۳۸ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۷۴-۵۶ میلی‌مول)
pH	۸/۰۵±۰/۱۰^b	۸/۵۰±۰/۳۳^a	۸/۴۲±۰/۰۹^a
اسپرماتوکریت (%)	۷۰/۰۸±۲/۵۸^a	۵۵/۳۶±۱۱/۸۲^b	۵۰/۵۷±۱/۳۸^b
تراکم اسپرم ($\times 10^9$)	۲/۰۶±۰/۱۱^a	۱/۶۷±۰/۴۳^b	۱/۴۸±۰/۰۵^b
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۹۰±۰/۲۸^a	۰/۵۴±۰/۲۴^b	۰/۵۰±۰/۰۷^b
طول دورهٔ تحرک اسپرم(ثانیه)	۵۶/۸۳±۲/۷۸^a	۴۵/۲۵±۸/۵۳^b	۴۳/۲۵±۲/۷۵^b
درصد اسپرم متحرک(%)	۶۱/۳۴±۲/۰۲^a	۵۰/۶۱±۵/۷۷^b	۴۹/۹۰±۴/۱۶^b

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

در جدول ۷ مقایسهٔ مقادیر نسبت پتاسیم به منیزیم را روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور معمولی نشان می‌دهد. مطابق جدول ۷ میزان حجم اسپرم‌دهی ($P<0/05$)، pH، اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، طول دورهٔ تحرک اسپرم و درصد اسپرم‌های متحرک ($P<0/01$) در بین سه تیمار دارای اختلاف معنی‌دار بود.

جدول ۷. مقایسهٔ مقادیر (میانگین ± انحراف معیار) نسبت پتاسیم به منیزیم روی پارامترهای اسپرم‌شناختی در سمن ماهی‌کپور

شاخص	تیمار ۱ (۹۳-۵۱ میلی‌مول)	تیمار ۲ (۱۳۵-۹۳ میلی‌مول)	تیمار ۳ (۱۷۷-۱۳۵ میلی‌مول)
pH	۸/۰۵±۰/۱۰^{b}	۸/۴۶±۰/۴۰^{a}	۸/۴۶±۰/۱۱^{a}
اسپرماتوکریت (%)	۷۰/۰۸±۲/۵۸^{a}	۵۷/۳۲±۱۳/۶۶^{b}	۵۰/۳۶±۱/۲۹^{b}
تراکم اسپرم ($\times 10^{9}$)	۲/۰۶±۰/۱۱^{a}	۱/۷۴±۰/۵۰^{ab}	۱/۴۷±۰/۰۴^{b}
حجم اسپرم‌دهی (سی‌سی)	۰/۹۰±۰/۲۸^{a}	۰/۶۱±۰/۲۵^{ab}	۰/۴۷±۰/۰۹^{b}
طول دورهٔ تحرک اسپرم(ثانیه)	۵۶/۸۳±۲/۷۸^{a}	۴۷/۰۰±۹/۵۳^{b}	۴۲/۶۰±۲/۷۹^{b}
درصد اسپرم‌متحرک(%)	۶۱/۳۴±۲/۰۲^{a}	۵۱/۳۲±۶/۸۵^{b}	۴۹/۶۲±۳/۶۶^{b}

حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف بیان‌گر وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها است.

بحث و نتیجه‌گیری

کنترل تولیدمثل یك راه نتیجه بخش در پیشرفت آبزی پروری است و یکی از عوامل محدود کنندهٔ تولیدمثل موفق، کیفیت گامت‌های ماهیان نر و ماده است [۱۱]. در نتیجهٔ توسعهٔ مزرعه‌های ماهی و افزایش برداشت ذخایر وحشی، بهبود تکنیک‌ها و روش‌های ذخیره‌سازی گامت‌ها برای تسهیل تکثیر مصنوعی ضرورت فراوان دارد [۶]. تعیین کیفیت سمن برای فهمیدن فرایندهای اصلی شیمیایی که در طول تحرک اسپرم و باروری اتفاق می‌افتد، برای ارزیابی توانایی تولیدمثلی انواع گونه‌های مختلف ماهیان و آماده کردن یک محیط بهینه برای ذخیره کردن اسپرماتوزوآ لازم است [۵]. به عبارت دیگر ارزیابی کیفیت اسپرم در ماهیان، بررسی فیزیولوژی اسپرم در بیضه‌ها و مجاری جنسی و بعد از استحصال و باروری لازم است [۱۰]. مطالعهٔ پارامترهای پلاسمای سمینال به دو دلیل امری مهم و ضروری است، نخست کسب دانش در رابطه با تأثیر پارامترهای بیوشیمیایی بر تکامل و بلوغ اسپرم در طی فصل تولید مثل و نحوهٔ آغاز حرکت اسپرم بعد از خروج از مجرای اسپرم، و مورد بعدی ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اسپرم جهت موفقیت در امر لقاح مصنوعی [۸].

نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش نسبت سدیم به پتاسیم، میزان pH پلاسمای سمن کاهش پیدا می‌کند ($P<0/01$) ولی میزان اسپرماتوکریت ($P<0/05$)، تراکم اسپرم ($P<0/05$)، حجم اسپرم‌دهی ($P<0/01$)، طول دورهٔ تحرک اسپرم ($P<0/01$) و درصد اسپرم‌های متحرک ($P<0/01$) افزایش می‌یابد. هوانگ و آیدلر [۱۵] وجود هم‌بستگی بین سدیم و پتاسیم پلاسمای سمینال در سالمون اطلس، سالمون سالار[۱] را به‌عنوان یك اصل بیان کردند.

۱. *Salmo salar*

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

علوی و کوسون [۷] بیان کردند که وجود تفاوت‌های واضح در نسبت‌های سدیم به پتاسیم بین استروژن‌ها، کپورماهیان و آزادماهیان نشان می‌دهد که چرا طول دورهٔ حرکت اسپرم در خاویاری‌ها نسبت به دو گروه دیگر طولانی‌تر است. کیفیت سمن در ماهی‌ها ابتدا به‌وسیله اندازه‌گیری تراکم اسپرم و درصد اسپرم‌های متحرك بررسی می‌شود. دورهٔ تحرك اسپرم و لقاح موفق دیگر عواملی هستند که برای بررسی کیفیت سمن مورد توجه هستند [۴]. از آن‌جا که پارامترهای اسپرم‌شناختی مطرح شده جزء پارامترهای کیفی سمن به حساب می‌آیند، می‌توان بیان کرد که با افزایش نسبت سدیم به پتاسیم پلاسمای سمن کیفیت اسپرم افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج این پژوهش (جدول ۳) در میزان pH در بین سه تیمار اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P>0/05$) ولی در بین بقیه پارامترها اختلاف معنی‌دار بود به‌نحوی که با افزایش نسبت سدیم به کلسیم میزان اسپرماتوکریت ($P<0/01$)، تراکم اسپرم ($P<0/01$)، طول دورهٔ تحرك اسپرماتوزوآ ($P<0/05$) و درصد اسپرم‌های متحرك ($P<0/05$) کاهش پیدا کرد. همچنین حجم اسپرم‌دهی در بین سه تیمار دارای اختلاف معنی‌داری بود ($P<0/05$) و در تیمار دوم بیش‌تر از دو تیمار دیگر بود و کم‌ترین آن در تیمار سوم مشاهده شد. تکه و همکاران [۱] گزارش کردند که با افزایش نسبت سدیم به کلسیم سمن در ماهی سفید دریای خزر میزان اسپرماتوکریت و طول دورهٔ تحرك اسپرم کاهش پیدا می‌کند، که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

چنان که در جدول ۴ و ۵ مشاهده می‌شود بین میزان کلسیم به منیزیم و سدیم به پتاسیم در بین سه تیمار اختلاف معنی‌دار نبود ($P>0/05$) ولی با توجه به نتایج مربوط به میزان کلسیم به منیزیم (جدول ۴) بیش‌ترین میزان طول دوره تحرك اسپرم و درصد اسپرم‌های متحرك در تیمار دوم مشاهده شد. در جدول ۵ (سدیم به منیزیم) بیش‌ترین میزان اسپرماتوکریت، تراکم اسپرم، حجم اسپرم‌دهی، طول دورهٔ تحرك اسپرماتوزوآ و درصد اسپرم‌های متحرك در تیمار اول ثبت شدند. تحرکات اسپرماتوزوآی ماهی به‌وسیلهٔ حساسیت آن‌ها به شرایط اسمزی و غلظت یون‌ها کنترل می‌شود [۷]. برای افزایش راندمان لقاح مصنوعی، ترکیب رقیق کننده‌های اسپرم خیلی مهم است و آن‌را باید به تقلید از ترکیبات پلاسمای سمینال ویژهٔ گونه‌ها همسان‌سازی کرد [۱۷].

با توجه به نتایج این پژوهش (جدول ٦) با افزایش نسبت پتاسیم به کلسیم میزان اسپرماتوکریت ($P<0/01$)، حجم اسپرم‌دهی ($P<0/05$)، تراکم اسپرم ($P<0/01$)، طول دورهٔ تحرك اسپرماتوزوآ ($P<0/01$) و درصد اسپرم‌های متحرك ($P<0/01$) کاهش پیدا می‌کندهٔ ولی میزان pH ($P<0/01$) نسبتاً افزایش می‌یابد.

در جدول ۷ نشان داده شده که با افزایش نسبت پتاسیم به منیزیم، میزان pH افزایش پیدا می‌کند ($P<0/01$) ولی میزان اسپرماتوکریت ($P<0/01$)، تراکم اسپرم ($P<0/01$)، حجم اسپرم‌دهی ($P<0/05$)، طول دورهٔ تحرك اسپرم ($P<0/01$) و درصد اسپرم‌های متحرك ($P<0/01$) کاهش می‌یابند که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر میزان پتاسیم

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

بیش‌تر شود و میزان منیزیم و کلسیم کم باشد در کیفیت اسپرم اثر منفی دارد. غلظت‌های یون‌ها به‌هم وابسته است. بیش‌تر این یون‌ها هر یک به‌وسیلهٔ سهمی که در ترکیب یونی داخل سلول یا به‌وسیلهٔ اثر روی اسمولاریته آن‌ها دارند در تنظیم تحرک اسپرم مؤثر هستند [۹]. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش نسبت سدیم به پتاسیم کیفیت اسپرم افزایش پیدا می‌کند ولی با افزایش نسبت سدیم به کلسیم، پتاسیم به منیزیم و پتاسیم به کلسیم کیفیت اسپرم کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین تغییرات نسبت‌های یونی کلسیم به منیزیم و سدیم به منیزیم تأثیر زیادی روی کیفیت اسپرم ندارند.

از نتایج این پژوهش می‌توان در ساخت محلول‌های شنا و یا مواد نگه دارنده برای نگه‌داری کوتاه و بلند مدت اسپرم در زمان خارج از فصل تکثیر و یا انجماد اسپرم به‌منظور انتقال به کارگاه‌های دیگر برای برنامه‌های هیبریدگیری یا اصلاح نژاد استفاده کرد که نتیجهٔ آن صرفه‌جویی در زمان، و کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و هزینه‌های تکثیر است.

تقدیر و تشکر

از مسئولین و کارکنان محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرم‌آبی و ماهیان خاویاری شهید رجایی ساری و آقایان مهندس مهدی طاعتی و امین گلپور تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع

۱. ش. تکه، م.ر. ایمانپور،م. سوداگر، و ع. شعبانی. *آثار نسبت‌های یونی روی خصوصیات زیست‌شناختی سمن در ماهی سفید* (*Rutilus frisii kutum kamensky 1901*) *مهاجر به رودخانهٔ شیرود*. مجلهٔ علوم و فنون دریایی دوره هفتم شمارهٔ ۱و۲ (۱۳۸۷) ۶۳- ۷۴.

۲. م. ستاری، د. شاهسونی، و ش. شفیعی، *ماهی‌شناسی (۲) سیستماتیک*، انتشارات حق‌شناس (۱۳۸۲) ۱۸۷ ص.

۳. غ.ح. وثوق، و ب. مستجیر، *ماهیان آب شیرین*، انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۷۳) ۹۶ تا ۹۸.

4. N. K. Agarwal, S. K. Raghuvanshi, "Spermatocrit and sperm density in snowtrout (*Schizothorax richardsonii*): Correlation and variation during the breeding season", Aquaculture 291(2009) 61-64.
5. S. M. H. Alavi, J. Cosson, M. Karami, H. Abdolhay, B. Majazi Amiri, "Chemical composition and osmolality of seminal fluid of *Acipenser persicus*; their physiological relationship with sperm motility", Aquaculture Research 35 (2004) 1238-1243.
6. H. S. M. Alavi, J. Cosson, "Sperm motility in fishes. I. Effects of temperature and pH: a review", Cell Biol. Int. 29 (2005) 101-110.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

7. S. M. H. Alavi, j. Cosson, "Sperm motility in fishes. II. Effects of ions and osmolality: a review", cell biology international 30 (2006) 1-14.
8. S. M. H. Alavi, M. Rodina, T. Policar, P. Kozak, M. Psenicka, O. Linhart, "Semen of *Perca fluviatilis* L.: Sperm volume and density, seminal plasma indices and effects of dilution ratio, ions and osmolality on sperm motility", Theriogenology 68 (2007) 276-283.
9. R. Billard, M. P. Cosson, "Some problems related to the assessment of sperm motility in freshwater fish", Journal of Experimental Zoology 261 (1992) 122-131.
10. R. Billard, J. Cosson, L. W. Crim, M. Suquet, "Sperm physiology and quality. In: Brood Stock Management and Egg and Larval Quality", [ed. by N.R. Bromage & R.J. Roberts], Blackwell Science, Oxford, UK. (1995) 25-52.
11. J. Bobe, C. Labbé, "Egg and sperm quality in fish", General and Comparative Endocrinology 165 (2010) 535–548.
12. A. Ciereszko, J. Glogowski, K. Dabrowski, "Biochemical characteristics of seminal plasma and spermatozoa of freshwater fishes", In: Cryopreservation of Aquatic Species (ed. by T.R. Tiersch & P.M. Mazik), Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, USA. (2000) 20-48.
13. J. Cosson, O. Linhart, S. D. Mims, W. L. Shelton, M. Rodina, "Analysis of motility parameters from paddlefish and shovelnose sturgeon spermatozoa", Journal of Fish Biology 56 (2000) 1-20.
14. J. L. Fitzpatrick, J. C. Henry, N. R. Leily, R. H. Devlin, "Sperm characteristics and fertilization succsess of masulinized coho salmon *Oncorhynchus kisutch*", Aquaculture 249 (2005) 459-468.
15. P. C. Hwang, D. R. Idler, "A study of major cations, osmotic pressure, and pH in seminal components of Atlantic salmon", J Fish Res Board Can 26 (1969) 413-419.
16. M. Morisawa, S. Oda, M. Yoshida, H. Takai, "Transmembrane signal transduction for the regulation of sperm motility in fishes and ascidians, In: Gagnon .C.(Ed.), The Male Gamete :From Basic Knowledge to Clinical Applications. Cache River press", Vienna, USA (1999) 149-160.
17. E. Rurangwa, D. E. Kime, F. Olevier, J. P. Nash, "The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured fish", Aquaculture 234 (2004) 1-8.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]

18. N. Tekin, S. Secer, E. Akcay, Y. Bozkurt, "Cryopreservation of rainbow trout *[Oncorhynchus mykiss*] semen", Israeli J. Aquacult. Bamidgeh 55 (2003) 208-212.
19. E. Turner, R. montgomerie, "Ovarian fluid enhance sperm movement in Arctic charr", Journal of Fish Biology 60 (2002) 1570-1579.
20. I. G. Winfield, J. S. Nelson, "Cyprinid fishes, systematic", biology and exploitation, First edition, Chapman and Hall. (1991) 667.

[Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2026-11-03]