

## معرفی گونه جدید *Onosma nuristanica* (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان

عتیق الله سلطانی احمدزی<sup>۱</sup>، حمید اجتهاudi<sup>۱</sup>، محمد فرزام<sup>۲</sup>، مارال بشیرزاده<sup>۲</sup>، فریده عطار<sup>۳</sup> و محمد رضا جوهرچی<sup>۴</sup>

آزمایشگاه تحقیقاتی اکولوژی آماری و تنوع زیستی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران؛<sup>۱</sup> گروه مرتع و آبخیزداری،

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران؛<sup>۲</sup> هریاریوم مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران،

ایران؛<sup>۳</sup> هریاریوم دانشگاه فردوسی مشهد، گروه گیاه شناسی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مسئول مکاتبات: حمید اجتهاudi  
hejtehadi@um.ac.ir

چکیده. گونه جدید *Onosma nuristanica* بر اساس نمونه‌های جمع‌آوری شده از پارون در نورستان و چپه‌دره در کبر از استان‌های شرق افغانستان شرح داده شده است. بررسی گستره پیشینه و مطالعه تطبیقی با نمونه‌هایی از چندین گونه خویشاوند نزدیک منجر به تشخیص این گونه جدید گردید. یافته‌های نگارندگان نشان‌دهنده واگرای معنی دار بین نمونه‌هایی مورد مطالعه از نظر مهم‌ترین ویژگی‌های ریخت شناختی (رنگ گل، طول برگ‌گه، طول دم‌گل، طول میله‌ها، شکل و برگ‌های ساقه) است. در این مقاله شرح مفصلی از گونه جدید و یک کلید شناسایی برای گونه‌های سرده *Onosma* در کشور افغانستان ارائه شده است و گونه جدید از نظر ریخت شناسی با گونه‌های نزدیک آن مقایسه شده است. همچنین، نقشه پراکنش گونه جدید و خویشاوندان نزدیک آن ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی. افغانستان، بومی، طبقه‌بندی، گونه جدید، Lithospermeae

## *Onosma nuristanica* (Boraginaceae), a new species from Afghanistan

**Atiqullah Sultani Ahmadzai<sup>1</sup>, Hamid Ejtehadi<sup>1</sup>, Mohammad Farzam<sup>2</sup>, Maral Bashirzadeh<sup>2</sup>,  
Farideh Attar<sup>3</sup> & Mohammad Reza Joharchi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Quantitative Plant Ecology and Biodiversity Research Lab., Department of Biology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Iran; <sup>2</sup> Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Iran; <sup>3</sup>Central herbarium of Tehran University, School of Biology, College of Science, University of Tehran, Iran; <sup>4</sup>Herbarium FUMH, Department of Botany, Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

Corresponding author: Hamid Ejtehadi, hejtehadi@um.ac.ir

**Abstract.** The new species *Onosma nuristanica* is described and illustrated here on the basis of specimens collected from Parun in Nuristan and Chapa Dareh in Kunar, one of the eastern provinces of Afghanistan. An extensive review of the literature and a comparative study with specimens from several herbaria led to the determine of this new species. Our results represent significant divergence between studied specimens in terms of the most important morphological features, i.e., flower color, pedicel length, bract length filaments length, caudate shape and form. In this article, a detailed description of the new species and a diagnostic key for *Onosma* species thriving in Afghanistan are provided and the new species is compared morphologically with its closely related species. In addition, a distribution map is provided for the new species and its close relatives in the area.

**Key words.** Afghanistan, endemic, new species, Lithospermeae, taxonomy

## مقدمه

طبق منابع متعدد (Boissier, 1879; Dinsmore, 1932; Hayek & Markgraf, 1970; Ernast, 1971; Popov, 1974; 1951; Riedl, 1978; Meikle, 1985; Teppner, 1991; Ge-Ling et al., 1995) نسبتاً قدیمی بیش از ۲۳۰ گونه *Onosma* گزارش شده است. با این حال، در سال‌های اخیر، مطالعات متعددی در رابطه با این سرده انجام شده است (Riedl et al., 2005; Kandemir & Turkmen, 2010; Almasi & Ranjbar, 2015; Cecchi et al., 2016; Alireza & Attar, 2016; Binzet, 2016a; Binzet & Eren, 2018; Attar et al., 2020; Firat & Binzet, 2021; Mehrabian et al., 2022) که منجر به افزایش تعداد (He et al., 2020) ۴۰ گونه در این سرده شد.

سرده *Onosma* عمدها در مناطق معتدل دنیا قديم پراکنده شده است که مرکز اصلی تنوع آن در منطقه ایران-تورانی است که بين کوههای اطلس در مراکش و آسیای مرکزی شرقی قرار دارد. گونه‌های *Onosma* بیشتر در ارتفاعات استپی قاره‌ای و توده‌های کوهستانی، کمتر در نزدیکی سطح دریا یافت می‌شوند (Mengoni et al., 2006; Cecchi et al., 2011; Mehrabian et al., 2013; Cecchi et al., 2016; Weigend et al., 2016; He et al., 2018 Weigend et al., 2009; 2013; Cecchi et al., 2011; Chacon et al., 2016; Nasrolahi, 2019) نشان داده که *Onosma* یک گروه خواهر Sudano-*Maharanga* در آسیای مرکزی به سرده *Echium*-*Cystostemon* Balf. Zambesian است. *clade*


افغانستان (مناطق فلوریستیک ایران-تورانی و سینو-ژاپنی) گونه *Onosma* (1960) Kitamura ثبت کرد. امروزه سرده *Onosma* با حدود ۱۱ گونه در افغانستان با میزان اندمیسم ۶۰ درصد شناخته می‌شود. طی سفرهای علمی میدانی در زون ژئومورفولوژی شرقی افغانستان، یک گونه ناشناخته از *Onosma* در ولایت نورستان شمالی جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل دقیق فلورها و پیشینه مرتبط و مقایسه با گونه‌های نزدیک، مشخص شد که گونه جمع آوری شده ما نمی‌تواند به هیچ گونه شناخته شده قبلی از مناطق ایران-تورانی و سینو-ژاپنی مطابقت داده شوند. بنابراین، این گونه در اینجا به عنوان گونه جدید برای علم مطرح شد. در کلید شناسایی، گونه‌هایی را که منتشر و پذیرفته شده‌اند ذکر کردیم، از ۱۱ گونه، گونه‌های *versicolor* و *O. afghanica* هنوز جایگاه آرایه شناختی مشخصی ندارند (Johnston, 1951). بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مهم‌ترین ویژگی این گونه‌های گیاهی و همچنین ویژگی‌های

Lithospermeae (از قبیله *Onosma* (Boraginaceae) یک سرده از گونه‌های غنی و قدیمی از گیاهان دوساله تا چند ساله، با کرک‌های زبر و راست تا خاردار (به ندرت با بوته‌های کوتاه)، با گل‌آذین گرزن دم عقربی تا استوانه‌ای و بذرهای مثلثی تخم مرغی و صاف (Riedl, 1978) است، که عمدها در زیستگاه‌های خشک با خاک‌های صخره‌ای تا شنی و رخنمنهای زمین شناسی سرینتین پراکنده دارد (He et al., 2020; Noroozi et al., 2022 Mengoni et al., 2006; Peruzzi & Passalacqua, 2008; Cecchi et al., 2011) بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناختی، شامل انواع کاسه گل و پوشش کرک‌ها، عمدها به بخش‌های *O. sect. Euonosma* و *O. sect. Aponosma* DC. Schur (1866) تقسیم می‌شود. *Boissier* (1875) و *Borbas* (1877) بر کرک‌های بلند به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی‌های طبقه بندی این سرده تأکید کردند که ارزش آن را برای تشخیص گونه‌ها حفظ کرده است (Mehrabian et al., 2014). با این حال، این گونه‌ها با تکیه بر ویژگی‌های کرک بلند (Boissier 1879) به سه گروه متعلق به بخش *Onosma* تقسیم شده‌اند، از جمله *O. subsect. subsect. Haplotricha* Bioss. *O. subsect. Asterotricha* و *Heterotricha* Boiss. با این حال، برخی از نویسندها (به عنوان مثال *Ozcan*, 2009; Cecchi et al., 2011; Cohen, 2011; Weigend et al., 2016) آن‌ها را به عنوان "گروه‌های غیررسمی" در قالب بخش‌های یکپارچه و همچنین گروه‌های خواهری *Maharanga* DC. و *Podonosma* Boiss. اعلام کردند. سرده جالبی از تیره گاوزبانیان است که مطالعه سیستماتیک آن نسبتاً دشوار است. نشانگر آرایه شناختی اصلی در این سرده نوعی پوشش کرک است که از کرک‌های خاصی به نام ستاره‌ای تشکیل شده است (Ball, 1972). همچنین برخی از ویژگی‌های کلیدی دیگر عبارتند از شکل، اندازه و رنگ‌های جام گل، اندازه کاسه گل، تعداد گل‌ها در خوشة، ریخت شناسی میوه و همچنین گرده (Qureshi & Qaiser, 1987; Maggi et al., 2008; Binzet & Akcin, 2009; Akcin & Binzet, 2011; Binzet, 2011; Mehrabian et al., 2012; Binzet et al., 2014; Attar et al., 2020) علاوه بر این، ویژگی‌های کاسه گل تفاوت بین دوره‌های گلدهی (Aytac & Türkmen, 2011) را نشان می‌دهد.

## مواد و روش‌ها

برخی از نمونه‌ها توسط نویسنده اول در طی یک سفر علمی میدانی در روستای تکری (پارون مرکزی، نورستان) در ۹ ژوئن ۲۰۲۱ جمع آوری شد، همچنین برخی از آن‌ها در نزدیکی گلنگل، شهرستان چپه دره، استان کنر در ۲۸ آوریل ۲۰۲۳ نیز مشاهده و جمع آوری شدند (شکل ۱). ما سعی کردیم این نمونه ناشناخته را با استفاده از فلورهای موجود برای افغانستان و کشورهای همسایه مانند فلور چین (Dian zi, 2022)، فلور پاکستان (Yasin, 2022)، فلور ایرانیکا (Riedl, 1967)، فلور Hooker & K.C.S.L. (Popov, 1974)، فلور هند (Riedl, 1978) و مطالعات بر روی گونه Johnston, (Boraginaceae XXI) *Onosma* سینو هندی (Johnston, 1951) شناسایی کنیم. با این حال، نمونه مورد مطالعه به طور برجسته‌ای از همه گونه‌های *Onosma* که در این فلورها داده شده بودند، متمایز است. بنابراین، این نمونه ناشناخته با گونه‌های *Onosma* گزارش شده از افغانستان و پاکستان مقایسه شد. در نهایت، نمونه هرباریومی با استفاده از کلیدهای شناسایی و توصیف گونه‌های مربوط به فلورهای مذکور و مقاله اشاره شده در بالا مورد بررسی قرار گرفت. این نمونه در هرباریوم دانشگاه فردوسی مشهد با شماره هرباریوم Sultani-Ahmadzai 47620 ثبت شد.

طبقه‌بندی و بوم‌شناسحتی در مقایسه با گونه‌های خواهری آن‌ها (*O. griffithii* و *O. khyberiana* از سینو-ژاپنی) موقعیت ثابتی را برای آن‌ها در فلور افغانستان فراهم می‌کند. افغانستان از نظر تنوع گیاهان آوندی یکی از غنی‌ترین کشورهای آسیای مرکزی است. آنچه باعث ایجاد چنین تنوع گیاهی خاص است، شرایط اقلیمی منحصر به فرد، ساختار ژئومورفولوژیکی، تنوع خاک، تغییرات ارتفاعی و موقعیت آن در محل اتصال دو منطقه فلوریستیک (ایرانی-تورانی و سینو-ژاپنی) است (Breckle & Rafipoor, 2010). همه عوامل ذکر شده با هم، ریزمحیط‌های مناسبی را برای ارائه طیف وسیعی از گونه‌های گیاهی و افزایش میزان گونه‌زایی فراهم کرده است. در این راستا، فلور افغانستان دارای حدود ۳۵۰۰ گونه گیاه‌آوندی است که درصد آنها بومی هستند (Groombridge, 1992; Ghahremaninejad et al., 2017) و این تعداد هنوز در حال افزایش است، زیرا ممکن است حدود ۵ تا ۱۰ درصد گونه‌ها در اکتشافات جدید آینده گنجانده شوند. تخمین زده می‌شود که حدود ۵۰۰۰ گونه و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد اندامیک باشد (Breckle & Rafipoor, 2010).



شکل ۱- نقشه پراکندگی از *O. nuristanica*  
Figure 1. Distribution map of *O. nuristanica*.

ساده یا بهندرت دوشاخه‌ای است. برآکتها  $12-7 \times 4-2$  میلی‌متر، سرنيزه‌ای تا واژسرنيزه‌ای، بدون دمبرگ، در انتهای نوک تیز. کاسه‌گل ۱۰ تا ۱۲ میلی‌متر، بند مثلثی-سرنيزه‌ای. جام گل سفید، استوانه‌ای استکانی به طول ۲۶ تا ۲۸ میلی‌متر، بدون کرک، لوب‌های  $1/5 \times 2$  میلی‌متر، به طور گسترده مثلثی، نوک تیز، بدون کرک حلقوی. بساک‌ها به طول ۸ تا ۱۰ میلی‌متر، در پایه به هم چسبیده اند. میله‌ها حدود ۱۵-۱۷ میلی‌متر، در پایه به هم چسبیده اند. میله‌ها حدود ۲۴-۲۵ میلی‌متر. خامه ۲۴-۲۵ میلی‌متر بیرون زده اندام جام گل، میلی‌متر. کلاله کوچک، به طور مشخص به صورت نقطه‌ای، دانه‌ها ناشناخته.

ریشه‌شناسی: اپیت خاص به پارک ملی و حفاظت حیات وحش نورستان، واقع در استان‌های نورستان و کتر در افغانستان اشاره دارد.

**پراکنده‌گی، فنولوژی و وضعیت حفاظت:** یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهد که *O. nuristanica* یک گونه بومی است به دلیل وجود آن که بین رستاههای تکری و پشکی شهرستان پارون ولایت نورستان در یک منطقه خاص، محدوده ارتفاعی باریک (۲۴۰۰-۲۵۰۰ متر) و گلنگل شهرستان چپه دره استان کتر در خاکهای مرطوب محصور شده است. مساحت اشغال شده توسط گونه جدید کمتر از ۴۰ کیلومتر مربع تخمین زده شد که بخشی از جنگلهای دیودار و در دامنه‌های جنوبی کوههای هندوکش است. بین عرض جغرافیایی ۲۹-۳۶ درجه و طول جغرافیایی ۶۸-۷۰ درجه و به طور خاص در مربع A6 قرار دارد (شکل ۶). به نظر می‌رسد، دلیل اصلی حضور محدود شدت زیاد چرا باشد. گیاهان همراه گونه *O. nuristanica* در جدول ۲ نشان داده شده است.

**فنولوژی:** گلدهی از ژوئن (خرداد) تا اول ژوئیه (تیر) و باردهی از اواخر آگوست (شهریور) تا سپتامبر (شهریور).

نکات طبقه‌بندی: گونه جدید متعلق به بخش *Onosma* و *dichronthis* است. که دارای ویژگی‌های گل‌آذین و ساقه تک است. که از نظر ویژگی‌های ریخت‌شناختی مشابه *O. griffithii* و *O. khyberiana* I.M.Johnst. *O. griffithii* با گلهای سفید مایل به کرم، طول برگه، طول ساقه و دم‌گل بود. با این حال، گونه جدید از *O. khyberiana* با گلهای سفید مایل به کرم، طول برگه، طول دم‌گل و شکل ساقه، و از *O. griffithii* با گلهای کرم، طول دم‌گل، شکل ساقه و طول میله‌ها متمایز می‌شود (جدول ۱).

## Taxonomic Treatment

***Onosma nuristanica* Sultani-Ahmadzai & Attar sp. nov. (Figs. 2-5)**

**Holotype:**—AFGHANISTAN. Nuristan: Parun, Tekri village,  $35^{\circ}30'87''$  N,  $70^{\circ}86'80''$  E, Elav. ca. 2478 m, 9 Jun 2021, Kunar: Chapa Dareh, Galangal, 28 April 2023, FUMH-47620 (Isotypes: TUH)

**Diagnosis:** *O. nuristanica* is similar to *O. khyberianum* and *O. griffithii*, but it differs by its white flowers, anther length, type of pedicel, calyx size, and the shape and length of indumentum (Table 1).

**Description:** Perennial with short erect stems, not woody, 22–25 cm long and to 1.0–1.5 mm in diameter, with 1–5 mm short hairs. Basal leaves  $60-100 \times 5.5-10.0$  mm, lanceolate, sessile; cauline leaves  $20-30 \times 8-10$  mm, lanceolate to oblanceolate, sessile, covered by setae on above and on midrib beneath and long hairy on both surfaces; lamina with entire margin, acute apex and attenuate base. Inflorescence of 3–6 cymes, elongating to 25 cm after flowering, scorpioid, simple or rare bifid. Bracts  $7-12 \times 2-4$  mm, lanceolate to oblanceolate, sessile, acute. Calyx 10–12 mm in flower, segments triangular-lanceolate. Corolla white, cylindric-campanulate 26–28 mm long, glabrous, lobes  $2 \times 1.5$  mm, widely triangular, acute, annulus glabrous. Anthers 8–10 mm long, connate at base. Filaments ca. 15–17 mm. Style 24–25 mm protruding outside the corolla limb, stigma small, distinctly pointwise, Seeds unknown.

**Etymology:** The specific epithet refers to Nuristan National Park and Wildlife Reserve, located in Nuristan and Kunar Provinces E Afghanistan.

**شرح به فارسی:** گیاهی چند ساله با ساقه‌های کوتاه، غیر-چوبی، به طول ۲۵-۲۲ سانتی‌متر و قطر  $1/5-1/10$  میلی‌متر، با کرک‌های کوتاه ۱-۵ میلی‌متر. برگ‌های پایه  $60-100 \times 5/5-5/5$  میلی‌متر، سرنيزه‌ای شکل، بدون دمبرگ. برگ‌های ساقه‌ای  $20-30 \times 8-10$  میلی‌متر، سرنيزه‌ای تا واژسرنيزه‌ای، بدون دمبرگ، پوشیده با کرک‌های بلند در سطح بالا و رگ برگ میانی زیر و در هر دو سطح. پهنک برگ با حاشیه صاف، در انتهای نوک تیز و پایه نازک. گل آذین ۳ تا ۶ خوش‌هایی که بعد از گلدهی تا ۲۵ سانتی‌متر دراز می‌شود، عقربی، دوقسمتی



شکل ۲- ظاهر کلی از گل آذین در طبیعت (عکس گرفته شده توسط ع. سلطانی احمدزی در محل).

**Figure 2.** The general appearance of *O. nuristanica*. A-B. The habit and close-up view of the inflorescence in nature (Photographed by A. Sultani Ahmadzai in the type locality).



شکل ۳- نمونه (۴۷۶۲۰) FUMH در هریاریوم *O. nuristanica*

**Figure 3.** The specimen of *O. nuristanica* in the herbarium of FUMH (47620).



شکل ۴- استریو-میکروگراف پوشش کرک از A: ساقه، B: گل، C: سطح بالای برگ، D: سطح پایینی برگ (عکس از ع. سلطانی احمدزی).

**Figure 4.** Stereo-micrographs of indumentum of *O. nuristanica*: A. stem, B. corolla, C. upper leaf surface, D. lower leaf surface (Photographed by A. Sultani Ahmadzai).



شکل ۵- استریو-میکروگراف جام گل از A: *O. nuristanica*. B: جام گل با کاسه گل، C: پرچم ها، D: مادگی، E-F: بخشی از گل آذین در نمونه هرباریوم (FUMH-47620) (عکس گرفته شده توسط ع. سلطانی احمدزی).


**Figure 5.** Stereo-micrographs of corolla of *O. nuristanica*: A. corolla, B. corolla with calyx, C. stamens, D. style, E-F. A part of Inflorescence in herbarium specimen (FUMH-47620). (Photographed by A. Sultani Ahmadzai).

**جدول ۱- مقایسه ویژگی‌های ریخت‌شناختی تشخیصی در بین *O. griffithii*, *O. khyberiana* و *Onosma nuristanica*****Table 1.** Comparison of diagnostic morphological characteristics among *Onosma nuristanica*, *O. khyberiana* and *O. griffithii*.

Morphological characters	<i>O. nuristanica</i>	<i>O. khyberiana</i>	<i>O. griffithii</i>
Plant height (cm)	22–25	38	10–20
Cauline leaves shape	oblong	lanceolate to oblanceolate	linear to linear-oblong
Cauline leaves size (mm)	20–30×8–10	25–35×5–7	35–55×8–10
Setae length (mm)	1–5	5	-
Basal leaf shape	oblanceolate	lanceolate to oblanceolate	Oblanceolate
Basal leaf size (mm)	60–100×5.5–10	40–90 x 5–9	30–150×5–15
Bract length (mm)	5–7	25	-
Bract shape	lanceolate triangular	lanceolate attenuate	Lanceolate
Inflorescence	scorpioid, simple or rare bifid	simple, rare bifid scorpioid	scorpioid, simple rare bifid
Pedicel length (mm)	sessile	3–11	1–3
Sepal length (mm)	10–12	15–20	-
Corolla length (mm)	26–28	30 or more	less than 30
Corolla color	white	creamy-white	Creamy
Corolla lobe (mm)	2×1.5	2.5	-
Anther length (mm)	8–10	10–12	9–12
Filaments length (mm)	15–17	12	6–9
Calyx length (mm)	10–12	15–20	15–20
Flowering time	Jun	April	April-May
Habitat/ Endemism	forest region/endemic	dry rocky/endemic	forest and dry rocky/sub endemic
Elevation range (m)	2400–2500m	2000m	1800–2900m

**جدول ۲- چک لیست گونه‌های همراه با گونه جدید *Onosma nuristanica*****Table 2.** The checklist of the species associated with *Onosma nuristanica*.

<i>Cedrus deodara</i> (Lamb.) G.Don
<i>Pinus wallichiana</i> A.B.Jacks.
<i>Abies spectabilis</i> (D.Don) Mirb.
<i>Pinus gerardiana</i> Wall. ex D.Don
<i>Quercus baloot</i> Griff.
<i>Asplenium trichomanes</i> L.
<i>Tragopogon gracilis</i> D.Don
<i>Tanacetum griffithii</i> (C.B.Clarke) Muradyan
<i>Myosotis asiatica</i> (Vestergr.) Schischk. & Serg.
<i>Arabis nova</i> Vill.
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb) Carvara & Grande
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
<i>Pseudoarabidopsis toxophylla</i> (M.Bieb.) Al-Shehbaz, O'Kane & R.A.Price
<i>Arenaria neelgherrensis</i> Wight & Arn.
<i>Rosularia viguieri</i> (Raym.-Hamet) J.M.H.Shaw ex G.R.Sarwar
<i>Geranium collinum</i> Steph. ex Willd.
<i>Scutellaria edelbergii</i> subsp. <i>kunarensis</i> Rech.f.
<i>Galium tricornutum</i> Dandy
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.
<i>Asyneuma argutum</i> subsp. <i>argutum</i> (Regel) Bornm.
<i>Crucihimalaya wallichii</i> (Hook.f. & Thomson) Al-shehbaz, O'Kane & R.A.Price



شکل ۶- نقشه پراکنش از *O. griffithii* و *O. khyberiana* و *O. nuristanica*

**Figure 6.** Distribution map of *Onosma nuristanica*, *O. khyberiana*, and *O. griffithii*.

کلید شناسایی گونه های *Onosma* در افغانستان.

**Key to the species of the genus *Onosma* in Afghanistan on the basis of total flower characteristics**

1	Anthers free, united only at the base	(2)
+	Anthers united	(3)
2 (1)	Corolla 25-30 mm long. Anthers 8-11 mm long	<i>O. dichroantha</i>
+	Corolla 7-8 mm long. Anthers 3-7 mm long	<i>O. limitanea</i>
3 (1)	Anthers included in corolla	(4)
+	Anthers exserted to more than half of corolla	(6)
4 (3)	Plants 10-70 cm or taller. Basal leaves 9-35 cm long	<i>O. hispida</i>
+	Plants up to 30 cm tall. Basal leaves up to 10 cm long	(5)
5 (4)	Bracts attenuate in upper part and acuminate. Corolla 30 mm or more in length. Filaments 10-12 mm long	<i>O. khyberiana</i>
+	Bracts acute. Corolla less than 30 mm long. Filaments 6-9 mm long	<i>O. griffithii</i>
6 (3)	Nectar pilosa	(7)
+	Nectar glabra	(8)
7 (6)	Corolla 18-22 mm long, whitish or yellowish, cylindrical-campanula. Filaments 5mm long. Plants biennial or rarely perennial.	<i>O. bulbotrichcha</i>
+	Corolla 7-9 mm long, non-narrowed, small tube or simple, primrose-yellowish. Filaments 2-4 mm long. Plants perennial, 10-25 cm tall.	<i>O. johnstonii</i> <i>O. intricata</i>
8 (6)	Plants 20-22 cm tall. Corolla 28 mm long. Calyx 15 mm long. Cauline leaves 17-19 cm long. Anthers 11mm long	<i>O. yamagata</i>
+	Plants 22-25 cm tall. Corolla 26-28 mm long. Calyx 10-12 mm long. Cauline leaves 35-55 mm long. Anthers 12-20 mm long	<i>O. nuristanica</i>

علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد برای کمک ارزشمندانه  
قدرتانی و تشکر ویژه کنند. نویسندهان همچنین مرائب تشکر  
فراآوان از دوست محترم مهندس قیام الدین خادم کارمند ریاست  
زراعت و مالداری استان نورستان و تیم آن ریاست که در جمع  
آوری نمونه ها همکاری نمودند را اعلام می دارند.

### سپاسگزاری

این مقاله بخشی از نتایج مقطع دکتری پایان نامه نویسنده اول  
با حمایت گرفت شماره ۵۵۷۷۲/۳ معاونت پژوهش و فناوری  
دانشگاه فردوسی مشهد است. نویسندهان مایلند از جنب آقای  
دکتر فرشید معماریانی استادیار گروه گیاه شناسی پژوهشکده

## REFERENCES

- Almasi, M. & Ranjbar, M.** 2015. *Onosma maculata* sp. nov. (Boraginaceae) from Iran. Nordic Journal of Botany 33: 522-525. <https://doi.org/10.1111/njb.00614>
- Attar, F., Sotoodeh, A. & Mirtadzadini, M.** 2020. Four new species in subsection *Asterotricha* for the genus *Onosma* L. (Boraginaceae) from flora of Iran. Feddes Repertorium 131: 146-158. <https://doi.org/10.1002/fedr.202000005>
- Akcin, O.E. & Binzet, R.** 2011. Micromorphological studies on nutlets of some *Onosma* L. (Boraginaceae) species from Turkey. Pakistan Journal of Botany 43: 743-752.
- Aytac, Z. & Turkmen, Z.** 2011. A new *Onosma* L. (Boraginaceae) species from southern Anatolia, Turkey. Turkish Journal of Botany 35: 269-274. <https://doi.org/10.3906/bot-1002-65>
- Breckle, S.W. & Rafipoor, M.D.** 2010. Field Guide Afghanistan; Flora and Vegetation. Scientia Bonnensis/Bonn, New York. pp: 57-60.
- Borbas, V.** 1877. Adatok Arbe es Veglia szigetek nyari floraja kozelebbi ismeretehez (Symbolae ad floram aestivam insularum Arbe et Veglia). Mathematikai es Termeszettudományi Kozlemeneyek 14: 365-436.
- Binzet, R. & Akcin, O.E.** 2009. Nutlet size, shape and surface ornamentation in 14 *Onosma* species (Boraginaceae). Acta Botanica Croatica 68: 117-126.
- Binzet, R.** 2011. Pollen morphology of some *Onosma* species (Boraginaceae) from Turkey. Pakistan Journal of Botany 43: 731-741.
- Binzet, R., Potoğlu Erkara, İ., Özler, H. & Pehlivan, S.** 2014. Pollen morphology and systematical contribution of some *Onosma* (Boraginaceae) taxa distribution in Turkey. Plant Systematics and Evolution 300: 2135-2146. <https://doi.org/10.1007/s00606-014-1030-z>
- Binzet, R.** 2016a. *Onosma anatolica*, a new species of Boraginaceae from Turkey. PhytoKeys 69: 39-49. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.69.8360>
- Boissier, P.E.** 1875. Plantarum orientalium novarum: decas secunda ex Flora orientalis volumine tertio mox exituro excerpta. H. Georg, Geneva. pp 9.
- Boissier, E.** 1879. Flora Orientalis, vol. 4: 178–203. Geneva.
- Ball, P.W.** 1972. *Onosma* L. – In: Tutin TG, Heywood VH, Burges NA, Moore DM, Valentine DH, Walters SM, Webb DA (ed.), Flora europaea: diapensiaceae to yoporaceae. vol. 3: 89-94. Cambridge University Press, Cambridge.
- Cecchi, L., Coppi, A. & Selvi, F.** 2011. Evolutionary dynamics of serpentine adaptation in *Onosma* (Boraginaceae) as revealed by ITS sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 297: 185-199. <https://doi.org/10.1007/s00606-011-0506-3>
- Cecchi, L., Coppi, A. & Selvi, F.** 2016. *Onosma juliae* (Boraginaceae), a new species from southern Turkey, with remarks on the systematics of *Onosma* in the Irano-Turanian region. Phytotaxa 288: 201-213. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.288.3.1>
- Cohen, J.I.** 2011. Phylogenetic analysis of morphological and molecular characters of *Lithospermum* L. (Boraginaceae) and related species: evolutionary relationships and character evolution. Cladistics 27: 1-22. <https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2011.00352.x>
- Chacon, J., Luebert, F., Hilger, H.H., Ovchinnikova, S., Selvi, F., Cecchi, L., Guilliam, C.M., Hasenstab-Lehman, K., Sutory, K., Simpson, M.G. & Weigend, M.** 2016. The borage family (Boraginaceae s.s.): a revised infrafamilial classification based on new phylogenetic evidence, with emphasis on the placement of some enigmatic genera. Taxon 65: 523-546. <https://doi.org/10.12705/653.6>
- Dinsmore, J.E.** 1932. Flora of Syria, Palestine and Sinai. vol. 1: 230-233. American Press Beirut, Beirut.
- Ernast, W.R.** 1971. Boraginaceae – In: Tutin, T.G.V.H., Heywood, N.A., Burges, D.M., Moore, D.H., Valentine, S.M. Walters & D.A., Webb (ed.) 1972. Flora Europaea. vol. 4: 1-459. Cambridge University Press, Cambridge.
- Firat, M. & Binzet, R.** 2021. *Onosma satensis* sp. nov. (Boraginaceae: Lithospermeae), a new species from Hakkari (Eastern Anatolia, Turkey). Adansonia 43: 185-195. <https://doi.org/10.5252/adansonia2021v43a16>
- Ghahremaninejad, F., Ataei, N. & Nejad Falatoury, A.** 2017. Comparison of angiosperm flora of Afghanistan and Iran in accordance with APG IV system. Nova Biologica Reperta 4: 73-97. <https://doi.org/10.21859/acadpub.nbr.4.1.74>
- Ge-Ling, Z., Riedl, H. & Kamelin, R.** 1995. Boraginaceae – In: editorial committee (eds.). Flora of China. vol. 6: 329-375. Science Press Beijing.
- Groombridge, B. (ed.)** 1992. Global Biodiversity-Staus of the earth's living resources. Chapman and Hall London. pp 585.
- Hayek, A. & Markgraf, F.** 1970. Prodromus floriae peninsulae. Balcanicae Verlag Des Repertoriums, Berlin. pp: 83-90.
- Hooker, C.B.J.D.** 1885. In: various botanists (ed.), Flora of British India. vol. 4: 177-179. Missouri Botanical Garden.
- He, Y., Hao, J.C., Ahmad, L. & Liu, Q.R.** 2018. *Onosma lhokaensis* (Boraginaceae), a new species from Xizang, China. Nordic Journal of Botany 36: 1-5. <https://doi.org/10.1111/njb.01770>
- He, Y., Xu, X.M., Zhou, Y. & Liu, Q.R.** 2020. *Onosma fuyunensis* (Boraginaceae), a new species from Xinjiang, China. PhytoKeys 144: 11-22. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.144.33287>
- Johnston, I.M.** 1951. Studies in the Boraginaceae XXI Sino-Indian species of *Onosma*. Journal of Arnold Arboretum 32: 344-368. <https://doi.org/10.5962/bhl.part.9732>
- Kitamura, Siro** 1960. Flora of Afghanistan. Results of the Kyoto university scientific expedition to the Karakorum and Hindukush. Kyoto University. vol. 2: 345-368.
- Kandemir, A. & Turkmen, Z.** 2010. A new species of *Onosma* (Boraginaceae) from eastern Turkey. Turkish Journal of Botany 34: 277-282. <https://doi.org/10.3906/bot-0902-13>

- Mehravian, A.R., Sheidai, M., Noormohammadi, Z., Mozafarian, V. & Asrei, Y.** 2013. Palynological diversity in the genus *Onosma* L. (Boraginaceae) of Iran. Annals Biological Research 3: 3885-3893.
- Mehravian, A.R., Sheidai, M. & Mozaffarian, V.** 2014. Micromorphology of leaf trichomes in *Onosma* (Boraginaceae) and their systematic relevance in Iran. Phytologia Balcanica 20: 41-56.
- Mehravian, A.R., Mozaffarian, V. & Naghizadeh, S.** 2022. Four new species of *Onosma* (Boraginaceae) from Iran as an important diversity center of the genus in the world. Collectanea Botanica 41: 1-22. <https://doi.org/10.3989/collectbot.2022.v41.003>
- Maggi, F., Kolarcik, V. & Martonfi, P.** 2008. Palynological analysis of five selected *Onosma* taxa. Biologia 63: 183-186. <https://doi.org/10.2478/s11756-008-0026-y>
- Mengoni, A., Selvi, F., Cusimano, N., Galardi, F. & Gonnelli, C.** 2006. Genetic diversity inferred from AFLP fingerprinting in populations of *Onosma echoioides* (Boraginaceae) from serpentine and calcareous soils. Plant Biosystems 140: 211-219. <https://doi.org/10.1080/11263500600756660>
- Meikle, R.D.** 1985. Flora of Cyprus. vol. 2: 1157-1163. Royal Botanic Gardens, Kew.
- Naqinezhad, Alireza & Attar, Farideh** 2016. *Onosma ghahremanii* sp. nov. (Boraginaceae), a new species from Alborz Mts., Iran. Phytotaxa 4: 268-286. <https://doi.org/10.11646/PHYTOTAXA.268.4.7>
- Norooz, M., Ghahremanejad, F., Bogler, D., Witherspoon, J.M., Ryand, G.L., Miller, J.S., Riahi, M. & Cohen, J.I.** 2022. Parsing a plethora of pollen: the role of pollen size and shape in the evolution of Boraginaceae. Cladistics 38: 204-226. <https://doi.org/10.1111/cla.12488>
- Nasrollahi, F., Osaloo, S.K., Mozaffarian, V. & Maivan, H.Z.** 2019. Molecular phylogeny and Divergence times of *Onosma* (Boraginaceae s.s.) based on nrDNA ITS and plastid rpl32-trnL (UAG) and trnH-psbA sequences. Nordic Journal of Botany pp 1-12. <https://doi.org/10.1111/njb.02060>
- Ozcan, T.** 2009. Characterization of *Onosma bracteosum* Hausskn. & Bornm. and *Onosma thracicum* Velen. Based on fatty acid compositions and α-tocopherol contents of the seed oils. IUFS Journal of Biology 68: 75-83.
- Peruzzi, L. and Passalacqua, N.G.** 2008. Taxonomy of the *Onosma echoioides* (L.) L. complex (Boraginaceae) based on morphometric analysis. Botanical Journal of Linnean Society 157: 763-774. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2008.00827.x>
- Popov, M.G.** 1951. Ad cognitionem meliorem generis *Onosma* L. Botanicheskie materialy Gerbariya Botanicheskogo Instituta Im.V.L.Komarova Akademii Nauk SSSR 14: 277-304.
- Popov, M.G.** 1974. Boraginaceous – In: Shishkin, B.K. (ed.) Flora URSS. vol. 19: 97-690. Akademia Nauk, Moscow.
- Qureshi, U.S. & Qaiser, M.** 1987. Palynological study of *Onosma* (Boraginaceae) from Pakistan. Pakistan Journal of Botany 19: 99-105.
- Riedl, H.** 1967. Boraginaceae – In: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica. vol. 48: 170-212. Akademische Druck-u. Verlagsanstalt.
- Riedl, H.** 1978. *Onosma* L. – In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. vol. 6: 326-376. Edinburg University Press, Edinburg.
- Riedl, H., Binzet, R. & Orcan, N.** 2005. A new species of *Onosma* (Boraginaceae-Lithospermeae) from southern Turkey. Edinburgh Journal of Botany 61: 127-130.
- Schur, P.J.F.** 1866. Enumeratio plantarum Transsilvaniae, exhibens stirpes phanerogamas sponte crescentes atque frequentius cultas, cryptogamas vasculares, charceas, etiam muscos hepaticasque. G. Braumüller, Vindobona [Wien], xviii pp 984.
- Tepper, H.** 1991. Karyology of some Greek *Onosma* species (Boraginaceae). Botanika Chronika 10: 271-292.
- Weigend, M., Gottschling, G., Selvi, F. & Hilger, H.H.** 2009. Marbleseeds are gromwells-systematics and evolution of *Lithospermum* and allies (Boraginaceae tribe Lithospermeae) based on molecular and morphological data. Molecular Phylogenetics and Evolution 52: 755-768. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.05.013>
- Weigend, M., Luebert, F., Selvi, F., Brokamp, G. & Hilger, H.H.** 2013. Multiple origins for hound's tongues (*Cynoglossum* L.) and navelseeds (*Omphalodes* Mill.).—The phylogeny of the borage family (Boraginaceae s.str.). Molecular Phylogenetics and Evolution 68: 604-618. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2013.04.009>
- Weigend, M., Gottschling, M., Selvi, F. & Hilger, H.H.** 2016. Boraginaceae – In: Kadereit, J. & Bittrich, V. (ed.), The families and genera of vascular plants. vol. 14: 41-101. Springer Inter Publishing, Cham.
- Dian zi, Cao Shu** 2022: [http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=28taxon\\_id=122943](http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=28taxon_id=122943) [accessed 15 Nov 2022]
- Yasin, J.Nasir.** 2022. [http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora\\_id=5taxon\\_id=122943](http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5taxon_id=122943) [accessed 15 Nov 2022].

\*\*\*\*\*

**How to cite this article:**

Sultani Ahmadzai, A., Ejtehadi, H., Farzam, M., Bashirzadeh, M., Attar, F. & Joharchi, M.R. 2023. *Onosma nuristanica* (Boraginaceae), a new species from Afghanistan. Nova Biologica Reperta 10: 230-239. (In Persian).

سلطانی احمدزی، ع.، اجتهادی، ح.، فرزام، م.، بشیرزاده، م.، عطار، ف.، جوهرچی، م.ر.، معرفی گونه جدید *Onosma nuristanica* (تیره گاوزبانیان)، از افغانستان. یافتههای نوین در علوم زیستی ۱۰: ۲۳۰-۲۳۹.